

Persantine - Thallium Scan

潘生丁—鉍扫描试验

這個試驗的目的是診斷你的心臟是否有疾病。潘生丁是一種使心臟產生類似于運動效果的藥物。鉍是一種微量放射性物質，用來使心臟在特殊掃描儀上產生圖象。

在幾分鐘時間內，醫師慢慢地將潘生丁注射進靜脈，同時密切地監視你的心電圖和血壓。接著將鉍注射進靜脈。然後，你平躺在裝置有掃描攝像機的平台上海約20-30分鐘。

四小時後（于下午_____PM），你必須回來再掃描一次。這次大約需40分鐘。

在兩次掃描之間，你只能喝清水或清湯。

這項試驗的準備，請注意以下事項：

1. 試驗前12小時內不要吃喝。
 2. 試驗前24小時不能吃含有咖啡因的食物（咖啡，茶，可樂，可可，巧克力）。
 3. 若你吃的藥含有茶鹼（Theophylline）成份，請諮詢你的醫師。可能會要求你在試驗前2-3天停藥。
 4. 如你有哮喘史，或有慢性肺部疾病，必須向醫生說明。
 5. 如你正服用心臟病藥品，請諮詢你的醫生。
- 若你正在懷孕，或疑已懷孕，請與你的醫生商討。
- 若你是糖尿病患者，也請諮詢你的醫生。
- 如你有進一步的問題，請與醫生或護士連絡。